

<b>Requested document:</b>	<b><a href="#">EP0967202 click here to view the pdf document</a></b>
----------------------------	--

## Photolysis of 7-dehydrocholesterol

Patent Number: EP0967202  
Publication date: 1999-12-29  
Inventor(s): JANSEN MICHAEL (FR)  
Applicant(s): HOFFMANN LA ROCHE (CH)  
Requested Patent: ☐ [EP0967202](#), [B1](#)  
Application Number: EP19990111626 19990616  
Priority Number(s): EP19990111626 19990616; EP19980111492 19980623  
IPC Classification: C07C401/00; B01J19/12  
EC Classification: [B01J19/12B](#), [B01J19/10D2](#)  
Equivalents:  
Cited Documents: [US4388242](#); [EP0118903](#); [US4686023](#); [DD279668](#); [EP0697374](#)

---


### Abstract

---

Quasi-monochromatic light from an excimer or exciplex emitter can be used to catalyze production of provitamin D3 from 7-dehydrocholesterol, resulting in a purer product than with mercury lamps, which emit a wider band of wavelengths. A photochemical method for preparation of provitamin D3 comprises treatment of 7-dehydrocholesterol (7-DHC) in a reactor with a source of ultraviolet radiation. The source is an excimer or exciplex emitter, which emits quasi-monochromatic UV light by the silent discharge method.

---

Data supplied from the esp@cenet database - I2



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



(11) **EP 0 967 202 A1**

(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:  
29.12.1999 Patentblatt 1999/52

(51) Int. Cl.<sup>6</sup>: **C07C 401/00**, B01J 19/12

(21) Anmeldenummer: 99111626.0

(22) Anmeldetag: 16.06.1999

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
**AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU  
MC NL PT SE**  
Benannte Erstreckungsstaaten:  
**AL LT LV MK RO SI**

(72) Erfinder: Jansen, Michael  
68870 Bartenhelm (FR)

(74) Vertreter: Buntz, Gerhard et al  
F.Hoffmann-La Roche AG  
Patent Department (PLP),  
124 Grenzacherstrasse  
4070 Basel (CH)

(30) Priorität: 23.06.1998 EP 98111492


(71) Anmelder:  
F. HOFFMANN-LA ROCHE AG  
4070 Basel (CH)

(54) **Photolyse von 7-Dehydrocholesterin**

(57) Die Herstellung von Prävitamin D<sub>3</sub> aus 7-Dehydrocholesterin erfolgt in einem Reaktor (1) mit einer UV-Strahlungsquelle (9). Diese Strahlungsquelle (9) ist ein Excimer- bzw. Exciplexstrahler, der nach dem Mechanismus der stillen Entladung im UV-Bereich quasi monochromatisch emittiert.

Der Reaktor (1) ist vorzugsweise ein Fallfilmreaktor

mit einem äusseren zylindrischen Mantel (7) und im Inneren ist koaxial ein zylindrisches Fallrohr (8) aus Quartz angeordnet, dessen Durchmesser etwa dem halben Durchmesser des Mantels entspricht. Ebenfalls koaxial ist in der Mitte der Anordnung ein Excimerstrahler (9) platziert.



**Fig. 2**

EP 0 967 202 A1

## Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein photochemisches Verfahren zur Herstellung von Prävitamin D<sub>3</sub> aus 7-Dehydrocholesterin in einem Reaktor mit einer UV-Strahlungsquelle.

[0002] Es ist bekannt, dass Prävitamin D<sub>3</sub> aus 7-Dehydrocholesterin (7-DHC) durch Bestrahlung zu erhalten ist. Dieses Prävitamin lässt sich durch thermische Umlagerung in das thermisch stabilere Vitamin D<sub>3</sub> überführen.

[0003] Die photochemische Synthese des Prävitamins erfolgte bisher in technischem Massstab durch Bestrahlung von 7-DHC mittels Quecksilber-Mitteldruck-Lampen. Da Ausgangsprodukt, Primärprodukt, aber auch Sekundärprodukte, im gleichen Wellenlängenbereich mit unterschiedlicher Effizienz absorbieren, wird mit polychromatischer Strahlung, wie sie von diesen Lampen geliefert wird, die Bildung photochemischer Sekundärprodukte begünstigt, die unwirksam und zum Teil toxisch sind. Beim derzeitigen Stand der Technik ist es daher erforderlich, die Bestrahlung schon nach relativ geringem Umsatz abubrechen. Das nicht umgesetzte 7-DHC wird rückgeführt, während das Primärprodukt in einem aufwendigen Aufbereitungsprozess gereinigt werden muss.

[0004] Eine weitere Konsequenz der im gleichen Wellenlängenbereich absorbierenden Substrate und Produkte sind Filtereffekte. So überlappt z.B. das Absorptionsspektrum von Prävitamin vollständig mit dem von 7-DHC, und das Prävitamin absorbiert mit zunehmendem Umsatz einen ständig wachsenden Anteil des Lichts.

[0005] Eine weitere Ursache für den Abbruch der Reaktion bei relativ geringem Umsatz (10-20%) ist die Tatsache, dass die Quantenausbeute der photochemischen Folgereaktion von Prävitamin D<sub>3</sub> z.B. zu Tachysterol grösser ist als die Quantenausbeute seiner Bildung.

[0006] Wichtigstes Problem bei der derzeitigen Produktion des Prävitamins D<sub>3</sub> ist aber die schlechte Abstimmung des Emissionsspektrums der Quecksilber-Mitteldruck-Lampen auf das Absorptionsspektrum von 7-DHC. Dies führt dazu, dass nur etwa 1% der Strahlung einer Quecksilber-Mitteldruck-Lampe im gewünschten Bereich zwischen 280 und 300 nm nutzbar sind. Diese Abschätzung vernachlässigt ausserdem den nicht unerheblichen Anteil der Produktion von unerwünschten Nebenprodukten durch Bestrahlung ausserhalb dieses optimalen Wellenlängenbereiches.

[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein photolytisches Verfahren zur Herstellung von Prävitamin D<sub>3</sub> aus 7-Dehydrocholesterin anzugeben, das weniger Nachteile als die Verfahren nach dem Stand der Technik aufweist.

[0008] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäss dadurch gelöst, dass man als Strahlungsquelle einen Excimer- bzw. Exciplexstrahler verwendet, der nach

dem Mechanismus der 'stillen Entladung' im UV-Bereich quasi monochromatisch emittiert.

[0009] Die Emissionswellenlänge dieser Strahler wird durch die Zusammensetzung der Excimer- oder Exciplex-bildenden Gase bestimmt. Excimer- bzw. Exciplexstrahler haben die besondere Eigenschaft, dass sie in ihrer Geometrie sehr variabel sind und in einem sehr engen Wellenlängenbereich emittieren. Sie können daher entsprechend den erforderlichen Reaktionsbedingungen im Rahmen der verfügbaren Gase und Materialien optimal ausgewählt und konstruiert werden. Die für die Herstellung von Vitamin D<sub>3</sub> erforderliche elektrische Leistung pro kg Produkt wird durch den Einsatz dieser Strahler erheblich verringert. Die monochromatische Strahlung der Excimer- bzw. Exciplexstrahler führt auch zu einer erheblichen Verbesserung der Produktreinheit.

[0010] Das Verfahren, Photonen aus Excimer- bzw. Exciplex-Reaktionen zu bilden, ist aus der Lasertechnologie bekannt. Laser-Photonenquellen sind jedoch wegen des hohen technischen Aufwands, ihrer für die präparative Photochemie wenig geeigneten Strahlungsgeometrie und der damit verbundenen ungenügend grossflächigen Strahlungsdichte für die photochemische Synthese von Prävitamin D<sub>3</sub> nicht geeignet.

[0011] Mit den erfindungsgemäss verwendeten Strahlern werden somit erstmals Strahlungsquellen eingesetzt, die praktisch ausschliesslich im optimalen Wellenlängenbereich der photochemischen Prävitamin-D<sub>3</sub>-Synthese emittieren und mit denen die oben beschriebenen Nachteile überwunden werden können. Sie eignen sich daher gut als Lichtquellen für die Prävitamin-D<sub>3</sub>-Synthese in technischem Massstab.

[0012] Typische Beispiele für Strahler, deren Emissionswellenlänge in dem für die Prävitamin-D<sub>3</sub>-Synthese erforderlichen optimalen Wellenlängenbereich liegt, sind mit XeBr sowie mit Br<sub>2</sub> gefüllte Excimerstrahler, die Photonen bei 285 bzw. 292 nm Wellenlänge emittieren. Als Beispiel wird das Emissionsspektrum der XeBr-Lampe in Abb. XX gezeigt.

[0013] Bei den erfindungsgemäss einsetzbaren Strahlern werden Excimer (Br<sub>2</sub>) bzw. Exciplexe (XeBr) gebildet, die bei Zerfall Photonen der gewünschten Wellenlänge emittieren. Beide Strahler haben sich bei ihrer Anwendung auf die photochemische Prävitamin-D<sub>3</sub>-Synthese als gute und leistungsfähige Strahlungsquellen erwiesen.

[0014] Das Verfahren der Erfindung eignet sich in gleicher Weise zur Herstellung der hydroxylierten bzw. acylierten Prävitamin D-Derivate (z.B. 1a-Hydroxy- bzw. 25-Hydroxy oder Acyloxiprävitamin D<sub>3</sub>).

[0015] Im folgenden wird anhand der beiliegenden Zeichnungen ein Ausführungsbeispiel der Erfindung beschrieben. Es zeigen

Fig. 1 den Aufbau eines geeigneten Reaktors

Fig. 2 einen vergrösserten Ausschnitt des Fallfilm-

reaktors

Fig. 3 das Emissionsspektrum eines geeigneten Strahlers

[0016] 7-Dehydrocholesterin wurde in 3,5%iger Lösung in einem Methanol/Hexan-Gemisch mit einer XeBr-Excimerlampe bei 284 nm in einem Fallfilmreaktor bestrahlt. In regelmässigen Zeitabständen wurde die Zusammensetzung des Reaktionssystems durch Hochleistungs-Flüssig-Chromatographie bestimmt. Bei dieser Wellenlänge besteht bei einem Umsatz von ca. 50% das erhaltene Reaktionsgemisch zu über 93% aus dem gewünschten Prävitamin D<sub>3</sub>. Das Ausgangsmaterial lässt sich nach bekannten Verfahren leicht abtrennen.

[0017] Die in Fig. 1 gezeigte Apparatur besteht aus einem Fallfilmreaktor 1 dessen Austragsleitung 2 direkt mit einem Vorlagebehälter 3 verbunden ist. Der Vorlagebehälter enthält den grössten Teil des Reaktionsgemisches. Eine Zuführungsleitung 4 für das Reaktionsgemisch führt vom Vorlagebehälter über eine Pumpe 5 und einen Wärmetauscher 6 zum Fallfilmreaktor. Der Fallfilmreaktor ist mit Leitungen 6 zur kontinuierlichen Spülung seines Innenraums mit Stickstoff versehen.

[0018] Die Austragsleitung 2 ist mit einem Anschluss für eine kontinuierliche Probenahme versehen.


[0019] Aus der vergrösserten Ausschnittsdarstellung der Fig. 2 ist der Aufbau des Fallfilmreaktors 1 ersichtlich. Er besitzt einen äusseren zylindrischen Mantel 7. Im Inneren ist coaxial ein zylindrisches Fallrohr 8 aus Quarz angeordnet, dessen Durchmesser etwa dem halben Durchmesser des Mantels entspricht. Ebenfalls coaxial ist in der Mitte der Anordnung ein Excimerstrahler 9 platziert.

[0020] Das Reaktionsgemisch gelangt von unten in den Reaktor und wird als Volumenstrom im ringförmigen Raum zwischen Mantel und Fallrohr nach oben geführt. Von dort strömt das Gemisch als Film an der Innenseite des Fallrohrs nach unten. Dieser Film ist der vom Strahler emittierten Strahlung 10 ausgesetzt.


[0021] In dem in Fig. 3 gezeigten Emissionsspektrum des in der Apparatur eingesetzten Xenon-Bromid-Excimer-Strahlers ist auf der Abszissenachse die Wellenlänge der emittierten Strahlung in nm und auf der Ordinatenachse die Intensität in ... - Einheiten angegeben.

#### Patentansprüche


1. Photochemisches Verfahren zur Herstellung von Prävitamin D<sub>3</sub> aus 7-Dehydrocholesterin in einem Reaktor mit einer UV-Strahlungsquelle, dadurch gekennzeichnet, dass die Strahlungsquelle ein Excimer- bzw. Exciplexstrahler ist, der nach dem Mechanismus der 'stillen Entladung' im UV-Bereich quasi monochromatisch emittiert.



**Fig. 1**



**Fig. 2**



**Fig. 3**



Europäisches  
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung  
EP 99 11 1626

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
X	US 4 388 242 A (MALATESTA VINCENZO ET AL) 14. Juni 1983 (1983-06-14) * Zusammenfassung * * Spalte 1, Zeile 50 - Spalte 2, Zeile 3 * * Abbildung 1 * ---	1	C07C401/00 B01J19/12
X	EP 0 118 903 A (MAX PLANCK GESELLSCHAFT) 19. September 1984 (1984-09-19) * Zusammenfassung * * Seite 4, Absatz 1 * * Seite 6, Absatz 1 - Absatz 4 * * Seite 7, Absatz 1 * * Abbildung 1 * ---	1	
X	US 4 686 023 A (STEVENS RICHARD D S) 11. August 1987 (1987-08-11) * Zusammenfassung * * Spalte 3, Zeile 6 - Zeile 17 * ---	1	
X	DD 279 668 A (UNIV SCHILLER JENA) 13. Juni 1990 (1990-06-13) * Zusammenfassung; Ansprüche * * Beispiel 1 * ---	1	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6)
X	CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 114, no. 9, 4. März 1991 (1991-03-04) Columbus, Ohio, US; abstract no. 82251, IKEDA, MASAHIRO ET AL.: "Laser photochemical synthesis of vitamin D analog" XP002116899 * Zusammenfassung * & REZA KAGAKU KENKYU, Bd. 11, 1989, Seiten 24-27, Jp ---	1	C07C B01J
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort <b>DEN HAAG</b>		Abchlußdatum der Recherche <b>29. September 1999</b>	Prüfer <b>Stevnsborg, N</b>
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1503 03.82 (P4C03)



Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung  
EP 99 11 1626

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
X	EP 0 697 374 A (SULZER CHEMTECH AG) 21. Februar 1996 (1996-02-21) * Zusammenfassung * * Spalte 3, Zeile 54 – Spalte 4, Zeile 6 * ---	1	
X	DATABASE COMPENDEX 'Online! ENGINEERING INFORMATION, INC., NEW YORK, NY, US SHANGGUAN CHENG ET AL: "Research of impure 7-DHC irradiated by UV laser beams" Database accession no. EIX93091650168 XP002116900 * Zusammenfassung * & YINYONG JIGUANG;YINYONG JIGUANG/APPLIED LASER TECHNOLOGY FEB 1993 CHINA INT BOOK TRADING CORP, BEIJING, CHINA, Bd. 13, Nr. 1, Februar 1993 (1993-02), Seiten 29-31, -----	1	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6)
Recherchenort <b>DEN HAAG</b>		Abschlußdatum der Recherche <b>29. September 1999</b>	Prüfer <b>Stevnsborg, N</b>
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument ..... & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1503 03.82 (Pd/C03)



**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT  
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 99 11 1626

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patendokumente angegeben.  
 Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am  
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

29-09-1999

Im Recherchenbericht angeführtes Patendokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
US 4388242	A	14-06-1983	KEINE		
EP 0118903	A	19-09-1984	DE	3308592 A	13-09-1984
			WO	8403509 A	13-09-1984
			EP	0139681 A	08-05-1985
US 4686023	A	11-08-1987	KEINE		
DD 279668	A	13-06-1990	KEINE		
EP 0697374	A	21-02-1996	JP	8099082 A	16-04-1996
			US	5614723 A	25-03-1997

EPO FORM P441

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82